

## ओभरडोजका जोखमि तत्त्वहरू तथा रोकथाम

ओपिओइडमा दुवै अवैध फेन्टानाइल र हेरोइन साथसाथै पीडाको उपचार गर्नका लागि प्रयोग गरिने नरिधारति औषधिहरू जस्तै मोर्फिन, कोडेन, मेथाडोन, अक्सीकोडोन (अक्सीकोन्टिन), परकोडन, परकोसेट), हाइड्रोकोडोन (विकोडिन, लोर्टयाब, नर्को), फेन्टानाइल (इयुरेगेसिक, फेन्टोरा), हाइड्रोमर्फोन (डिलाउडि, एकजालगो) र बुप्रिनोर्फिन (सबुटेक्स, सुबोकोन) समावेश हुन्छन्। ओपिओइड ओभरडोजका केही सामान्य जोखमि तत्त्वहरू साथसाथै केही रोकथाम रणनीतिहरू यसप्रकार छन्:

### औषधिहरू मसिउने

मानसिहरले मदरि र/वा बेन्जोडाइजेपनिहरूमा ओपिओइडसहर मसिउदा धेरैजसो ओभरडोजहरू हुने गर्छ। ओपिओइडजस्ता यी लागू पदार्थहरूले व्यक्तिको श्वासप्रश्वासको क्षमतामा प्रभाव पार्ने हुँदा वशिषगरी मदरि र बेन्जोडाइजेपनिहरू (जानेक्स, क्लोनोपनि, एटभिान र भ्यालयिम) खतरनाक हुन्छन्। ओपिओइडलाई अन्य औषधिहरू वा मदरिसँग मसिउने नगर्नुहोस्। नरिदेशकले ओपिओइड र बेन्जोडाइजेपनि नरिधारति गरेमा, नरिदेशति गरिनुअनुसार मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।

### सहषिणुता

सहषिणुता भनेको औषधि प्रक्रिया गर्ने तपाईंको शरीरको क्षमता हो। सहषिणुता जता बेला पनि परिवर्तन हुन सक्छ त्यसैले तपाईंलाई यसका प्रभावहरू महसुस गर्नका लागि थप औषधि आवश्यक पर्न सक्छ। कसैले ओपिओइडको प्रयोगबाट वशिराम लपिमा सहषिणुता दुरुत रूपमा घटन सक्छ। कसैले सहषिणुता गुमाउँछ र त्यसपछि फेरि ओपिओइड लनिछ भने, उनीहरूले वगितमा कुनै समस्या नहुनेगरी मात्रा प्रयोग गरे तापनि, उनीहरू ओभरडोजको जोखमिमा हुन्छन्। तपाईंले मादक पदार्थ छोडेको समयावधिपछि ओपिओइडहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, न्यून डोजबाट सुरु गर्नुहोस्।

### शारीरिक स्वास्थ्य

तपाईंको शारीरिक स्वास्थ्यले ओपिओइडहरू व्यवस्थिति गर्ने तपाईंको शरीरको क्षमतालाई प्रभाव पार्छ। ओपिओइडहरूले तपाईंको श्वासप्रश्वासको क्षमतालाई हानी पुर्याउन सक्ने भएकोले, तपाईंलाई दमरोग वा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी अन्य समस्याहरू भएमा तपाईं ओभरडोजको उच्च जोखमिमा हुनुहुन्छ। कलेजो (हेपाटाइटिस), मृगौलासम्बन्धी समस्याहरू भएका र HIV पोजेटिभ भएका व्यक्तिको नरि ओभरडोजको बढ्दो जोखमिमा हुन्छन्।

### पछिल्लो ओभरडोज

वगितमा अघातक ओभरडोज अनुभव गरेका व्यक्तिलाई भविष्यमा घातक ओभरडोजको बढ्दो जोखमि हुन्छ। घातक ओभरडोज रोकनका लागि, ओभरडोज कसरी पहिचान गर्ने र प्रतिक्रिया जनाउने भनी आफ्ना परिवार तथा साथीहरूलाई सकिनुहोस्।

## कोही व्यक्तिले ओभरडोज लडिरहेको छ भने मैले कसरी थाहा पाउने?

कसैले आफ्नो शरीरले सम्हाल्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी ओपिओइड सेवन गर्नुभयो भने उनीहरू बेहोश हुन सक्छन्, उनीहरूको श्वासप्रश्वास बन्द हुन र मृत्यु हुन सक्छ। ओपिओइड ओभरडोज देखा पर्न केही मिनेट वा घण्टा पनि लाग्न सक्छ।

ओभरडोज अनुभव गरिरहेको व्यक्तिलाई नमिने लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन्:

- श्वासप्रश्वास ढलियो हुने (प्रत्येक 5 सेकेण्डमा एक पटकभन्दा कम श्वासप्रश्वास हुने) वा बलिकुलै श्वासप्रश्वास नहुने।
- वान्ता हुने।
- अनुहार पहेलो र चसियो हुने।
- ओठ, औंलाका नडहरू वा खुट्टाका नडहरू नीलो हुने।
- ढलियो, अस्थिर तरिकाले धड्कनि वा नधड्कनि।
- नदिउँदा वा झपकी लौँदा घुस्ने वा गर्जेको आवाजहरू आउने।
- तपाईंले व्यक्तिको नामले चर्च्याउँदा वा नकलहरूले छातीको बीच भागमा रगड्दा कुनै प्रतिक्रिया नदनि।

ओभरडोज चकितिसा आकस्मिक अवस्था हो!  
9-1-1 मा तुरुन्तै फोन गर्नुहोस्



Board of  
Pharmacy

RecoveryOhio

[www.pharmacy.ohio.gov](http://www.pharmacy.ohio.gov)

## ओभरडोज पहिचान र प्रतिक्रिया मार्गदर्शक



बरिमी र हेरचाहकर्ताहरूका  
लागि मार्गनरिदेशन

ओहायोको फार्मेसी बोर्ड

Steven W. Schierholt  
कार्यकारी नरिदेशक

## नालोकजोन भनेको के हो?

नलक्सन (नर्क्यान) एक चिकित्सकले लेखनुपर्ने औषधि हो, जसले ओपओइड औषधिको अधिक मात्रा (ओभरडोज) बाट भएको प्रतिक्रियालाई उल्टाउन सक्छ। ओभरडोज भएको बेलामा प्रयोग गर्दा, नालोकजोनले मस्तिष्कमा ओपओइडका प्रभावहरूलाई ब्लक गर्छ र श्वासप्रश्वासलाई पूर्वावस्थामा ल्याउँछ। यसलाई मांसपेशीमा सुई वा नाकमा स्प्रेको रूपमा दनि सकिन्छ।

नालोकजोनमा दुरुपयोगको कुनै सम्भावना छैन। ओपओइड ओभरडोज अनुभव नगरेको व्यक्तिलाई दिएकोमा, यो हानिरहित हुन्छ। ओपओइड ओभरडोज अनुभव गरेको व्यक्तिलाई नालोकजोन प्रयोग गर्दा, यसले नसासम्बन्धी प्रतिकारका लक्षणहरू उत्पन्न गर्ने छ। नालोकजोनले गैर-ओपओइड औषधिको कारणले गर्दा भएका ओभरडोजहरूको प्रतिक्रियालाई उल्टाउँदैन।

**महत्त्वपूर्ण:** नालोकजोनलाई कोठाको तापक्रममा र प्रकाशदेखि टाढा भण्डार गर्नुपर्छ। नलक्सन कम तापक्रममा जम्नसक्छ। यसो भयो भने औषधिले उद्देश्यअनुरूप काम नगर्न सक्छ।

## मद्दत कहाँ प्राप्त गर्ने

**988** SUICIDE & CRISIS  
LIFELINE Ohio

988 नम्बरमा सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईंलाई मानसिक स्वास्थ्य, लोपोपचारको प्रयोग र थप कुराका लागि 24/7 जाचवनि सहायता दिइन्छ। 988 मा टैक्सट पठाउनुहोस्, फोन गर्नुहोस् वा च्याट गर्नुहोस्।

मेलमार्फत निःशुल्क नालोक्सोन पाउनुहोस्

[www.naloxone.ohio.gov](http://www.naloxone.ohio.gov)

RecoveryOhio - How to Get Help

[www.pharmacy.ohio.gov/GetHelp](http://www.pharmacy.ohio.gov/GetHelp)

Substance Abuse & Mental Health Services

Administration Treatment Locator

<https://findtreatment.gov/>

## ओभरडोज हुँदा कसरी प्रतिक्रिया जनाउने

1. व्यक्तिलाई उहाँको नामले चिच्याएर र नकलहरूले छातीको बीच भागमा रगडे (स्टर्नम रब) जगाउने प्रयास गर्नुहोस्।

2. 9-1-1 मा फोन गर्नुहोस्। व्यक्तिले श्वास फेर्न छाड्नुभएको वा श्वास फेर्नमा कठिनाई भइरहेको भए बताउनुहोस्।

3. व्यक्तिको मुखमा उहाँको श्वासप्रश्वास रोक्न सक्ने खालको केही वस्तु नभएको सुनिश्चिती गर्नुहोस्। श्वासप्रश्वास रोकिएको छ वा नकि सुस्त छ भने, उद्धार श्वासप्रश्वास सुरु गर्नुहोस्।

### 4. उद्धार श्वासप्रश्वास दनिहोस्

**चरण 1:** उहाँको टाउकोलाई पछाडि झुकाउनुहोस्, चिउँडोलाई

उठाउनुहोस्, नाकलाई बन्द गर्न पोरा च्यापदिनुहोस्।

**चरण 2:** हरेक 5 सेकेण्डमा 1 पटक वसितारै श्वास दनिहोस्। व्यक्तिको छाती फुलाउनका लागि उहाँको फोक्सोमा पर्याप्त हावा भरिनुहोस्।

5. नालोकजोन प्रयोग गर्नुहोस् र प्रत्येक 5 सेकेण्डमा एक पटक श्वास दिएर उद्धार श्वासप्रश्वास जारी राख्नुहोस्।

6. व्यक्तिले आफैँ श्वास फेर्न सुरु गरेमा, उहाँहरूको वान्तामा अवरुद्ध नहोस् भन्नका लागि उहाँलाई कोल्टो पारेर राख्नुहोस्। एक मिनटमा 10 भन्दा कम श्वासप्रश्वास भएमा उहाँहरूको श्वासप्रश्वास नरिक्षण गर्न र उद्धार श्वासप्रश्वास गर्न जारी राख्नुहोस्। वान्ता भएमा, उहाँहरूको मुख र नाकलाई हातैले सफा गर्नुहोस्।

7. उक्त व्यक्तिले ब्युँझाउँदा, बोलाउँदा वा छुँदा कुनै पनि प्रतिक्रिया दनिभएन वा 2-3 मिनटभित्तै सामान्य रूपमा सास फेर्न थाल्नुभयो भने नलक्सनको अर्को खुराक दनिपर्छ।

8. EMS नआइपुग्दासम्म उक्त व्यक्तिसँगै रहनुहोस्।


\*कृपया अर् नलक्सन स्त्रणहरू उपलब्ध भएकाबारे जानकारी रहनुहोस्। ओहायो कानुनले नलक्सनका स्त्रणहरू वितरण गरिएका बेला बरिमीहरू प्रशिक्षित हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ। यो बरोसमा नालोकजोनको सुत्रीकरण वितरण गर्ने कार्य सूचीबद्ध गरिएको छैन भने फारमासिटहरूले प्रक प्रशिक्षण सामग्रीहरू प्रदान गर्नुपर्छ।

## नलक्सन कसरी दनि\*:

**NARCAN™ (4MG) र Kloxxado™ (8MG) नाकको स्प्रे**

1. नाकको स्प्रे खोल्न टुप्पो (ट्याब) हटाउनुहोस्।

2. ठेलदा भित्तै जाने भाग (प्लन्जर) को तल्लो पट्टी बुढी औँलाले र नाकमा पस्ने भाग (नोजल) को कुनै एटा छेउमा चोरी औँला र बचिको औँलाले उक्त यन्त्र समातनुहोस्। तपाईं डोज दनिका लागि तयार नहुँदासम्म कुनै पनि दबाव नदनिहोस्।



3. व्यक्तिको टाउकोलाई पछाडितिर झुकाउनुहोस् र तपाईंको हातले घाँटीको तल सहायता प्रदान गर्नुहोस्। व्यक्तिको टाउकोलाई पछाडितिर झुकाउनुहोस् र तपाईंको हातले घाँटीको तल सहायता प्रदान गर्नुहोस्। नोजलको कुनै एटा छेउमा तपाईंका औँलाहरू व्यक्तिको नाकको तल नहुँदासम्म एटा नाकको प्वालमा नोजलको टपिलाई बसितारै घुसाउनुहोस्।

4. औषधिको डोज दनिका लागि रातो प्लन्जरमा बसितारै थिच्नुहोस्। डोज दइसकेपछि नाकको प्वालबाट उक्त यन्त्र हटाउनुहोस्।

5. 2 देखि 3 मिनटपछि पनि उक्त व्यक्तिले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाउनुभएन भने अर्को नाकको प्वालमा थप डोज दनिहोस्।

उत्पादकका निर्देशनहरूको पूर्ण प्रतिलिपिका लागि, यहाँ हेर्नुहोस्:

[www.pharmacy.ohio.gov/NARnasal](http://www.pharmacy.ohio.gov/NARnasal) (NARCAN)

[www.pharmacy.ohio.gov/KLONasal](http://www.pharmacy.ohio.gov/KLONasal) (Kloxxado)

## ZIMHI™ (नालोक्सोन HCl) सुई

1. सुईको ढक्कन घुमाएर खोलसिकेपछि बाहरी तघिरामा सुइरो घोच्नुहोस्।

2. प्लन्जरले कटिक आवाज ननकिलेसम्म त्यसलाई थिच्नुहोस् र सुई हटाउनुअघि त्यसलाई 2 सेकेण्डसम्म समातारिख्नुहोस्। यदा प्लन्जर पूर्ण रूपमा तलैसम्म थिचिएको छ र त्यसले औषधि देखि भागलाई छेकेको छ भने सही तरिकाले खुराक दिएको छ भन्ने मान्नुहोस्। सुईमार्फत खुराक दइसकेपछि पनि अधिकांश औषधि सुईमै रहनु सामान्य कुरा हो।

3. एक हातका औँलाहरूले सुइरोको पछाडिपट्टि समातेर सुइरो अड्ने भाग (सेफ्टी गार्ड) तलतिर तान्नुहोस्। तपाईंले सुई लगाउने बत्तिकै यसो गर्नुहोस्।

4. प्रयोग गरिसकिएको सुई नीलो खोलमा राखेर बन्द गर्नुहोस्। 2 देखि 3 मिनटपछि पनि उक्त व्यक्तिले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाउनुभएन भने नयाँ यन्त्र प्रयोग गरेर थप खुराक दनिहोस्। उत्पादकका निर्देशनहरूको पूर्ण प्रतिलिपि पाउन नमिन वेबसाइटमा हेर्नुहोस्: [www.pharmacy.ohio.gov/KLONasal](http://www.pharmacy.ohio.gov/KLONasal)